

قرص آزیترومایسین

Azithromycin



تهیه کننده : زهرا امیرطاهری افشار
واحد آموزش به بیمار بیمارستان
تایید کننده : خانم دکتر حمزه نژاد
مسئول فنی داروخانه
و خانم دکتر سلطانی مسئول فنی
داروخانه

تاریخ توپین : 1404/06/31
تاریخ بازنگری : 1405/06/31
کد سند : P-PH /C-T /16 /01

آزیترومایسین چیست و چه کاری انجام می دهد؟

آزیترومایسین یک آنتی بیوتیک است. آنتی بیوتیک ها داروهایی هستند که برای درمان عفونت های باکتریایی (نه ویروسی مثل سرماخوردگی یا آنفولانزا) استفاده می شوند. این دارو با متوقف کردن رشد باکتری ها عمل می کند.

چرا باید آزیترومایسین مصرف کنم؟

- این دارو برای درمان انواع مختلفی از عفونت ها کاربرد دارد، از جمله:
- عفونت های گلو و لوزه (مانند گلودرد چرکی)
- عفونت های گوش میانی
- عفونت های ریه، برونشیت و ذات الریه
- برخی عفونت های پوستی
- عفونت های مجاری ادراری و تناسلی
- نکته مهم: فقط عفونت هایی را که پزشک برایتان تشخیص داده است، درمان می کند.

دستور مصرف: چگونه آزیترومایسین را مصرف کنم؟ (مهمترین بخش)

- ❖ دستور پزشک را دقیق دنبال کنید: دارو را دقیقاً طبق دستور پزشک و به میزانی که او گفته است مصرف کنید. نه بیشتر، نه کمتر و نه برای مدت طولانی تر.
- با یا بدون غذا؟ می توانید این دارو را با غذا مصرف کنید تا از ناراحتی معده جلوگیری کنید. اگر معده شما حساس است، خوردن آن همراه یک وعده غذایی یا snack کوچک بهترین کار است.
- قرص را قورت دهید: قرص یا کپسول را به طور کامل با یک لیوان پر آب قورت دهید. آن را نجوید، نشکنید و خرد نکنید.
- شربت: اگر شربت مصرف می کنید، حتماً از پیمانه مخصوص داخل جعبه استفاده کنید تا مقدار دارو را دقیق اندازه گیری کنید. از قاشق معمولی آشپزخانه استفاده نکنید.
- زمان مصرف: سعی کنید دارو را در ساعات مشخصی از روز مصرف کنید تا فراموش نشود. اگر یک نوبت را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید. اما اگر تقریباً زمان نوبت بعدی رسیده است، نوبت فراموش شده را رها کرده و به برنامه معمول خود بازگردید. هرگز دو دوز را با هم مصرف نکنید.

تداخل دارویی (خیلی مهم!)

- ❖ به پزشک خود در مورد تمام داروهای دیگری که مصرف می کنید اطلاع دهید، به ویژه:
- داروهای ضداسید (برای معده) - بین مصرف آزیترومایسین و این داروها حداقل 2 ساعت فاصله بگذارید.
- وارفارین (رقیق کننده خون)
- داروهای قلبی خاص



خلاصه و نکات کلیدی

- دستور پزشک را دقیق اجرا کنید.
- با غذا بخورید تا معده تان اذیت نشود.
- دوره درمان را حتماً کامل کنید.
- در صورت اسهال شدید، دل درد شدید یا زردی فوری به پزشک مراجعه کنید.
- در مورد سایر داروهای مصرفی خود با پزشک و داروساز مشورت کنید.

منابع :

[Drugs.com](https://www.drugs.com)

هشدارهای مهم و موارد منع مصرف !

در چه شرایطی به پزشک اطلاع دهیم؟

- **حساسیت:** اگر به آزیترومايسين يا هر آنتی‌بیوتیک دیگری (مانند اریترومايسين، کلاریترومايسين) حساسیت دارید، حتماً قبل از مصرف به پزشک خود اطلاع دهید.
- **بیماری‌های کبدی یا کلیوی:** اگر مشکل کبد یا کلیه دارید، پزشک باید بداند.
- **بیماری قلبی:** اگر سابقه مشکلات قلبی (مثلاً بینظمی ضربان قلب) دارید، به پزشک اطلاع دهید.
- **بارداری و شیردهی:** اگر باردار هستید، قصد بارداری دارید یا به کودک خود شیر می‌دهید، قبل از مصرف با پزشک مشورت کنید.

دوره درمان را کامل کنید!

❖ مهمترین نکته:

حتی اگر بعد از یکی دو روز احساس کردید حالتان بهتر شده است، به هیچ وجه مصرف دارو را خودسرانه قطع نکنید. دوره درمان را تا انتها ادامه دهید. اگر زود دارو را قطع کنید، ممکن است عفونت کاملاً از بین نرود و مجدداً عود کند و حتی باکتری نسبت به دارو مقاوم شود (یعنی دفعه بعد آن دارو دیگر اثر نکند).

هشدارها و عوارض جانبی احتمالی

❖ مثل همه داروها، آزیترومايسين هم می‌تواند عوارضی داشته باشد. همه این عوارض را تجربه نمی‌کنند.

❖ عوارض شایع (معمولاً خفیف):

- حالت تهوع، استفراغ، دل درد، اسهال
- سردرد
- احساس سبکی سر

چه کار کنیم؟ اگر این عوارض خفیف بودند و از بین رفتند، جای نگرانی نیست. مصرف دارو با غذا می‌تواند به کاهش تهوع کمک کند.

❖ عوارض نادر اما جدی (فوری به پزشک مراجعه کنید):

اگر هر یک از علائم زیر را مشاهده کردید، بلافاصله مصرف دارو را قطع کرده و با پزشک خود تماس بگیرید:

- اسهال شدید و آبکی
- دل درد یا گرفتگی عضلات شکم شدید
- ادرار تیره‌رنگ، زردی پوست یا چشم‌ها (علائم مشکلات کبدی)
- تپش قلب شدید، احساس سبکی سر یا غش کردن
- کمبود شنوایی (به صورت موقت)
- بثورات پوستی شدید، کهیر یا خارش پوست