



قبل از مصرف این دارو چه چیزهایی را باید به تیم درمانی خود بگویید؟

- قبل از دریافت سفازولین، حتماً به پزشک یا پرستار خود اطلاع دهید اگر:
- آلرژی به هر نوع آنتی‌بیوتیک (به ویژه پنی‌سیلین یا سایر سفالوسپورین‌ها مانند سفیکسیم، سفالکسین) دارید.
- بیماری کلیوی دارید یا تحت دیالیز هستید.
- بیماری کبدی، روده یا معده دارید.
- باردار هستید، قصد بارداری دارید یا در دوران شیردهی هستید.
- هرگونه داروی دیگری اعم از نسخه‌ای، غیرنسخه‌ای، ویتامین‌ها یا مکمل‌های گیاهی مصرف می‌کنید.

دستور مصرف: چگونه سفازولین را مصرف کنم؟ (مهمترین بخش)

نحوه دریافت: این دارو به آرامی و در مدت زمان مشخص (معمولاً 30-60 دقیقه) درون رگ (IV) یا در عضله (IM) تزریق می‌شود.

❖ عوارض جانبی شایع (که معمولاً خفیف هستند):

- احساس سوزش یا درد در محل تزریق
- اسهال خفیف

سفازولین چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟

❖ نوع دارو: آنتی‌بیوتیک تزریقی از خانواده سفالوسپورین‌ها

سفازولین یک آنتی‌بیوتیک قوی است که برای مقابله با عفونت‌های باکتریایی در بدن شما استفاده می‌شود. این دارو با از بین بردن باکتری‌ها یا توقف رشد آن‌ها عمل می‌کند. توجه کنید که این دارو برای عفونت‌های ویروسی مانند سرماخوردگی یا آنفولانزا موثر نیست.

چرا باید سفازولین مصرف کنم؟

- پیشگیری از عفونت در حین یا پس از جراحی (به ویژه جراحی‌های قلب، استخوان و مفاصل)
- درمان عفونت‌های جدی مانند:
- عفونت‌های استخوان و مفاصل
- عفونت‌های خونی (سپسیس)
- عفونت‌های پوست و بافت‌های نرم
- ذات‌الریه
- عفونت‌های مجاری ادراری
- این دارو معمولاً در بیمارستان یا مراکز درمانی به صورت تزریق داخل وریدی (IV) یا تزریق داخل عضلانی (IM) توسط پرسنل پزشکی تجویز می‌شود

سفازولین (Cefazolin)

نام تجاری رایج در ایران: Ancef, -Kefzol



تهیه کننده : زهرا امیرطاهری افشار
واحد آموزش به بیمار بیمارستان
تایید کننده : خاتم دکتر حمزه نژاد
مسئول فنی داروخانه
و خاتم دکتر سلطانی مسئول فنی
داروخانه

تاریخ توین : 1404/06/31
تاریخ بازنگری : 1405/06/31
کد سند : P-PH / C-T / 19 / 01



سوالات متداول

سوال: اگر یک دوز از دارو فراموش شود چه؟
 * پاسخ: در محیط بیمارستان، پرستاران برنامه تزریق را مدیریت می‌کنند. نگران نباشید.

*** سوال:** آیا این دارو با غذا تداخل دارد؟
 * پاسخ: خیر، اما اگر حالتان تهوع می‌آورد، می‌توانید در مورد زمان مناسب مصرف غذا با پرستار خود مشورت کنید.

*** سوال:** پس از ترخیص از بیمارستان چه؟
 * پاسخ: معمولاً سفازولین فقط در بیمارستان استفاده می‌شود. اگر پزشک نسخه ای برای تزریق در خانه برای شما نوشته است، حتماً دستورالعمل‌های دقیق پرستار یا پزشک را برای نگهداری و تزریق دارو دنبال کنید

منابع :

[Drugs.com](https://www.drugs.com)

هشدارها

- 1. دوره درمان را کامل کنید:** حتی اگر احساس می‌کنید بهتر شده‌اید، دوره درمان با آنتی‌بیوتیک را تا انتها طبق دستور پزشک ادامه دهید. قطع زودهنگام دارو ممکن است باعث عود عفونت و ایجاد مقاومت باکتریایی شود.
- 2. آزمایشات:** اگر دوره درمان طولانی‌مدت دارید، ممکن است پزشک برای بررسی عملکرد کلیه‌ها، آزمایش خون درخواست کند.
- 3. عفونت‌های ثانویه:** آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند باکتری‌های مفید بدن را نیز از بین ببرند و ممکن است باعث ایجاد عفونت‌های قارچی (مانند برفک دهان یا عفونت واژینال) شوند. در صورت مشاهده علائم جدید، به پزشک اطلاع دهید.
- 4. تداخلات دارویی:** مصرف همزمان الکل با سفازولین می‌تواند عوارض جانبی مانند تهوع و سردرد را افزایش دهد. بهتر است در طول درمان از مصرف الکل خودداری کنید.

عوارض جانبی احتمالی

- تهوع یا استفراغ
- سردرد
- خارش یا rash پوستی (کهیر)
- اگر این عوارض شدید شد یا از بین نرفت، به پرستار یا پزشک خود اطلاع دهید.
- در صورت مشاهده هر یک از علائم زیر، بلافاصله پرستار یا پزشک خود را مطلع کنید، زیرا ممکن است نشان‌دهنده یک واکنش آلرژیک یا عارضه جدی باشد:
- علائم واکنش آلرژیک شدید:
- کهیر، بثورات پوستی شدید
- تورم صورت، لب‌ها، زبان یا گلو
- مشکل در تنفس یا بلع
- احساس تنگی نفس
- علائم مشکلات گوارشی جدی:
- اسهال آبی یا خونی شدید (که ممکن است نشانه عفونت جدیدی در روده باشد)
- درد شدید معده یا گرفتگی عضلات
- علائم دیگر:
- تب یا لرز جدید
- زردی پوست یا چشم‌ها (یرقان)
- ادرار تیره‌رنگ
- کبودی یا خونریزی غیرعادی
- تشنج
- تزریق مکرر یا دردناک ادرار (ممکن است نشانه عفونت قارچی باشد)