

علائم سقط عفونی

درد شکمی احساس درد یا ناراحتی در ناحیه شکم

خونریزی غیرطبیعی خونریزی شدید یا لکه‌بینی

تب و لرز: نشانه‌ای از عفونت

بوی بد از واژن: که نشان‌دهنده وجود عفونت است

خستگی و ضعف شدید: به دلیل تأثیر عفونت بر بدن

روش‌های پیشگیری

مراقبت‌های بهداشتی: از جمله رعایت بهداشت شخصی، شست‌وشو صحیح دست‌ها و استفاده از محافظت در هنگام رابطه جنسی

واکسیناسیون: واکسن‌هایی مانند واکسن آنفلوانزا و هپاتیت B

می‌توانند از بروز برخی عفونت‌ها جلوگیری کنند

درمان به موقع عفونت‌ها: از آنجایی که برخی عفونت‌ها به راحتی قابل درمان هستند، درمان سریع می‌تواند از عواقب جدی جلوگیری کند

آنتی‌بیوتیک درمانی: در صورت شناسایی عفونت‌های باکتریایی، استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های مناسب توصیه می‌شود



عوامل ایجاد کننده سقط عفونی:

عفونت‌های باکتریایی

عفونت‌هایی مانند سفالوسپورین‌ها، استافیلوکوک‌ها و استرپتوکوک‌ها می‌توانند باعث بروز عفونت در رحم و سقط جنین شوند

عفونت‌های ویروسی

ویروس‌هایی مثل هرپس سیمپلکس، زیکا، و آنفلوانزا نیز می‌توانند منجر به مشکلات بارداری و در نهایت سقط جنین شوند

عفونت‌های قارچی

عفونت‌های قارچی مانند کاندیدا آلبیکانس ممکن است بر بارداری تأثیرگذار باشند

بیماری‌های مقاربتی

بیماری‌هایی مانند کلامیدیا، گونوکاک و سفلیس نیز می‌توانند عامل بروز سقط عفونی باشند



- سقط عفونی یا سقط ناقص به زمانی اطلاق می‌شود که در اثر عفونت یا التهاب، بارداری به طور غیرطبیعی و بدون کنترل به پایان می‌رسد. این نوع سقط می‌تواند به علت عفونت‌های باکتریایی، ویروسی یا قارچی ایجاد شود که به صورت مستقیم به رحم و بهافت‌های **SURROUNDING** آن آسیب می‌زنند.





دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تهیه کننده:

فاطمه کریم زاده

بیمارستان خاتم الانبیاء بافت
بخش لیبر

کد سند: P_PH/C_T/160/01

تاریخ تنظیم: 1404/5/30

تاریخ بازنگری: 1405/5/30

خطرات و عوارض:

عفونت‌های گسترده: در صورتی که عفونت به بافت‌های دیگر بدن گسترش یابد، ممکن است مشکلات جدی‌تری مانند سپسیس ایجاد شود

آسیب به رحم: گاهی اوقات عفونت‌های شدید ممکن است به بافت رحم آسیب رسانده و باروری را تحت تأثیر قرار دهد

تهدید زندگی مادر: در موارد بسیار شدید، عفونت‌های بدون درمان می‌توانند تهدیدی برای سلامت یا حتی زندگی مادر باشند

نتیجه‌گیری

سقط عفونی می‌تواند یک مشکل جدی و خطرناک باشد که نیاز به شناسایی سریع و درمان به موقع دارد. رعایت بهداشت فردی، پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی و درمان عفونت‌ها می‌تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند و سلامت مادر و جنین را تضمین کند

نکات درمانی:

درمان پزشکی: در صورت مشاهده علائم سقط عفونی، باید به پزشک مراجعه کنید تا درمان مناسب صورت گیرد. این درمان ممکن است شامل آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای ضد ویروس یا ضد قارچ‌ها باشد

مراقبت‌های پس از سقط: در صورت بروز سقط، نظارت پزشکی برای جلوگیری از عفونت‌های بعدی و مراقبت‌های مربوط به ترمیم بدن ضروری است