



خطر مسمومیت با متادون در کودکان

علائم هشدار!!



- . خواب‌آلودگی شدید یا بیهوشی: کودک ممکن است به سختی بیدار شود یا هوشیاری خود را از دست بدهد.
- . مشکل در تنفس: تنفس کند، سطحی یا توقف تنفس که تهدید جدی زندگی است.
- . کبودی لب‌ها و ناخن‌ها.
- . گیجی، ضعف و عدم تعادل: کودک نمی‌تواند درست حرکت کند یا صحبت کند.
- . تهوع و استفراغ.



توصیه به والدین



- . داروها را دور از دسترس کودکان نگه دارید: همه داروها، به ویژه متادون، باید در کابینت قفل‌دار یا بالا از دسترس کودک باشند.
- . داروها را در بطری اصلی و با برچسب نگه دارید: هرگز داروها را در ظروف خوراکی یا نوشیدنی نریزید تا کودک به اشتباه مصرف نکند.
- . آموزش کودک: به کودک یاد دهید که هرگز دارویی بدون اجازه بزرگتر مصرف نکند.
- . دقت در مصرف خانواده: هنگام مصرف متادون یا داروهای خطرناک، مطمئن شوید کودک آن را نمی‌بیند و به آن دسترسی ندارد.
- . آمادگی برای شرایط اضطراری: شماره اورژانس 115 همیشه در دسترس باشد و در صورت مشاهده علائم مسمومیت فوراً تماس بگیرید یا کودک را به بیمارستان ببرید.

تهیه کننده: زهرا امیرطاهری افشار
واحد آموزش به بیمار بیمارستان خاتم الانبیا
شهرستان بافت

متادون چیست؟

متادون یک داروی مسکن قوی و درمان جایگزین برای ترک اعتیاد به مواد مخدر مانند هروئین است. این دارو تنها تحت نظر پزشک و با دوز مشخص مصرف می‌شود. متادون ممکن است به شکل قرص، شربت یا آمپول باشد و گاهی در خانه‌های افراد معتاد نگهداری می‌شود.



مسمومیت متادون در کودکان

مسمومیت با متادون معمولاً زمانی رخ می‌دهد که کودک به صورت تصادفی دارو را مصرف کند. بدن کودکان نسبت به داروهای مخدر بسیار حساس است، بنابراین حتی مقدار کم متادون می‌تواند باعث مشکلات شدید یا حتی مرگ شود. از علل مسمومیت: 1. خوردن متادون در خانه توسط کودک 2. اشتباه در دوز دارو هنگام مصرف خانواده 3. دسترسی کودکان به شربت یا قرص بدون برچسب و در ظروف نامناسب.

